

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIỀN SĨ ĐƯA LÊN MẠNG

Tên đề tài luận án: "SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA HÓA – XẠ TRỊ TRƯỚC MỔ VỚI HÓA XẠ - TRỊ SAU MỔ TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN II-III."

Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa Mã số: 62720125

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vương Nhất Phương.

Họ và tên người hướng dẫn: PGS TS. Cung Thị Tuyết Anh (HDC)

PGS TS. Nguyễn Việt Thành. (HDP)

Tên cơ sở đào tạo: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Qua nghiên cứu 119 trường hợp ung thư trực tràng giữa và dưới giai đoạn II – III trong nhóm can thiệp và 101 trường hợp trong nhóm chứng, chúng tôi ghi nhận:

1. Bệnh nhân nhóm can thiệp cho tỉ lệ phẫu thuật tận gốc, tỉ lệ phẫu thuật bảo tồn cơ thắt cao hơn nhóm chứng (96,8% so với 77,2% và 73,9% so với 55,4%, $p<0,001$ - Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê).
2. Hóa – xạ trị trước mổ không làm gia tăng thời gian phẫu thuật, lượng máu mất, tai biến và biến chứng như nhau.
3. Đối với những trường hợp ung thư trực tràng giữa và dưới, giai đoạn II - III còn phẫu thuật được, hóa - xạ trị trước mổ kết hợp phẫu thuật không làm giảm tỷ lệ tái phát tại chỗ trong 02 năm (2,8% so với 0%, $p=0,55$), không làm tăng tỷ lệ sống còn toàn bộ 02 năm (88,5% so với 84,5%, $p=0,4$) và sống còn không bệnh 02 năm (87,5% so với 84,5%, $p=0,63$).

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020
NGHIÊN CỨU SINH

PGS TS. Cung Thị Tuyết Anh

PGS TS. Nguyễn Việt Thành

Vương Nhất Phương

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Trần Diệp Tuấn

ONLINE Ph.D. DISSERTATION INFORMATION

The Ph.D. Dissertation title: “COMPARISON OF EFFECTIVENESS BETWEEN PRE- AND POST OPERATIVE CHEMORADIO-THERAPY FOR RECTAL CANCER STAGE II - III”

Specialty: Gastro-intestinal Surgery Code: 62720125

Ph.D. candidate: Vương Nhất Phương

Supervisor 1: Associate Professor Cung Thị Tuyet Anh, M.D, Ph.D.

Supervisor 2: Associate Professor Nguyen Viet Thanh, M.D, Ph.D.

Academic institute: University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

SUMMARY OF NEW FINDINGS

Through researching 119 cases of middle and lower rectal cancer stage II - III in the intervention group (IG) and 101 cases in the control group (CG), we found:

1. Patients in the intervention group had a higher rate of radical surgery, the rate of sphincter preservation surgery was higher than the control group (96.8% compared with 77.2% and 73.9% compared to 55.4%, p value <0.001 - The difference was statistically significant).

2. Pre-operative chemoradio-therapy did not increase the operation time, blood loss. The complications and mortality between two groups were the same.

3. For cases of middle and lower rectal cancer stage II - III which could be operated, pre-operative chemoradio-therapy combined with surgery did not reduce the local recurrence rate in 2 years (2, 8% compared with 0%, p = 0.55), did not increase the overall survival rate for 2 years (88.5% compared to 84.5%, p = 0.4) and remained alive for 2 years (87.5% compared to 84.5%, p = 0.63).

Supervisor

Ho Chi Minh City, June 26th, 2020

Ph.D. candidate

Asso.Prof. Nguyễn Việt Thành

Vương Nhất Phương

Asso.Prof. Cung Thị Tuyết Anh.

Prof. TRẦN DIỆP TUẤN, MD, PhD
President